


Алгоритм неотложных действий при сердечном приступе (советы пациенту) –
памятка для пациента



Алгоритм неотложных действий при ОНМК (советы пациенту) – памятка для пациента

Помогите больному принять удобное сидячее или полусидячее положение в кресле или на кровати, подложив под спину подушки. **Если больной без сознания** положите его на бок, удалите из полости рта съемные протезы (остатки пищи, рвотные массы), убедитесь, что больной дышит

Обеспечьте приток свежего воздуха. Расстегните воротничок рубашки, ремень или пояс, снимите стесняющую одежду



Измерьте температуру (t) тела больного


Если $t \geq 38^{\circ}\text{C}$ или более дайте больному 2 таблетки парацетамола по 0,5 г (таблетки разжевать, проглотить)

При отсутствии парацетамола другие жаропонижающие препараты принимать нельзя!

Положите на лоб и голову лед или продукты из морозильника, уложенные в непромокаемые пакеты, обернутые полотенцем. **Если глотание затруднено, изо рта капает слюна, наклоните голову к более слабой стороне тела**, промокайте стекающую слюну чистыми салфетками

Если пострадавший не может говорить или его речь невнятная, успокойте его заверив, что это состояние временное. **Держите его за руку на непарализованной стороне, пресекайте попытки разговаривать и не задавайте вопросов, требующих ответа.** Помните, что хотя пострадавший и не может говорить, он осознает происходящее и слышит все, что говорят

Алгоритм неотложных действий при гипертоническом кризе (советы пациенту)
– памятка для пациента



Алгоритм неотложных действий при острой сердечной недостаточности (советы пациенту) – памятка для пациента



Нитроглицерин 0,5 мг
Капсулу раскусить, положить
под язык, не глотать

Принять, рекомендованные лечащим
врачом лекарства:

1. _____
(вписывает врач с указанием дозы).
2. _____

**ОБЕСПЕЧИТЬ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ,
СЕСТЬ, ЛУЧШЕ В КРЕСЛО С
ПОДЛОКОТНИКАМИ, НОГИ ОПУСТИТЬ В
ТАЗ или ВЕДРОС ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ**



Ацетилсалициловая
кислота 0,25 г
Таблетку разжевать, проглотить

Если после приема первой капсулы
нитроглицерина **наступило облегчение**, то
продолжать его прием по 1 капс. каждые
10-15 мин до прибытия скорой помощи

Нитроглицерин 4 капсулы по 0,5 мг



**При отсутствии отчетливого облегчения
– нитроглицерин не принимать**